

KUŽNI KAŠELJ



KUŽNI KAŠELJ oz. TRAHEOBRONHITIS

Kužni kašelj je zelo nalezljivo obolenje zgornjih dihal, ki se pojavlja praktično po vsem svetu. Povzročitelji bolezni so lahko virusi (virus parainfluenze – CPiV, adenovirus tip 2 – CAV, respiratorni corona virus – CRCoV, Morbillivirus oz. virus pasje kuge – CDV, Pneumovirus – CnPnV, Herpes virus - CHV...), bakterije (Bordetella bronhiseptica, Mycoplasma Cyanos, Streptococcus zooepidemicus ...), običajno pa gre za mešano okužbo, ko se virusom pridružijo še bakterije.

Okužba se prenaša izjemno hitro z izdihanim zrakom, izločki iz nosu ali izpljunki, možen pa je tudi prenos prek okuženih predmetov oz. opreme. Klinični znaki bolezni se običajno pojavijo od 4 do 10 dni po okužbi, psi pa lahko kužni kašelj prenašajo tudi še več tednov po tem, ko bolezen že prebolijo. Zbolijo lahko vsi psi, ne glede na starost, najbolj ogroženi pa so mladiči, starejši in necepljeni psi.

Prvi znak bolezni je močan in suh kašelj, ki se običajno pojavi ob razburjenju, fizičnih naporih ali pri pritisku na sapnik (npr. zateg ovratnice).




Kašelj je lahko tako močan, da se žival davi in neredko tudi bruha penasto slino ali hrano. Pogosto se pojavi tudi voden izcedek iz nosu in/ali oči. Kadar bolezen poteka v milejši obliki, splošno stanje ni prizadeto, psi so ješči in živahni. V hujših primerih pa se poleg močnega in pogosto produktivnega kašlja pojavi še povišana telesna temperatura, dihanje je oteženo, živali apatične, imajo gnojen izcedek iz nosu, izgubijo apetit ... Vse to lahko vodi v razvoj pljučnice.

Če bolezen poteka v milejši obliki, terapija običajno ni potrebna. Psu je priporočljivo ponuditi več manjših obrokov mehkejše hrane, odsvetuje se fizična aktivnost, zaradi občutljivega sapnika pa namesto ovratnice obolelemu psu raje namestimo oprsnico. Kot podporo pri zdravljenju se svetujejo tudi kvalitetni vitamini. V resnejših primerih pa je potrebna terapija z antibiotiki, zdravili za umirjanje kašlja in/ali bronhodilatatorji. Zelo prizadete paciente je včasih potrebno tudi hospitalizirati.



Tjaša Peternelj



Tjaša Peternelj

Najboljša preventiva pred okužbo s kužnim kašljem je, da pes sploh ne pride v kontakt z okuženimi predmeti (ležišča, igrače, posode za vodo ...) oz. z drugimi okuženimi psi (izogibajmo se prireditvam in prostorom, kjer se nahaja veliko psov). Ker to pogosto ni mogoče, je zelo priporočljivo pse zaščititi z vakcinacijo, čeprav tudi ta žal pred boleznijo ne ščiti popolnoma, saj so pogoste okužbe z že zgoraj omenjenimi mešanimi povzročitelji. V Sloveniji kot preventivo uporabljamo kombinirano cepivo, ki pse ščiti proti pasji kugi, kužnemu hepatitisu, parvovirozi, leptospirozi in parainfluenci, ponekod v tujini pa so registrirane tudi intranazalne vaccine proti kužnemu kašlju, ki pse ščitijo pred virusom parainfluence in bakterijo Bordetella bronhiseptica.

S kužnim kašljem se veliko pasjih lastnikov sreča vsaj enkrat, na srečo pa večina okužb mine brez večjih komplikacij.

Zapisala: Nuša Schumet, dr. vet. med.